

# Schutz vor Verbisschäden

Verbisschäden werden von fast allen Schalenwildarten verursacht. Dazu gehören vor allem Rehwild, Damwild und Rotwild. Gefährdet sind Kulturen und Jungbestände, deren Terminaltriebe (der höchste Trieb) noch nicht aus der Reichweite des Äsers (des Mauls) der Wildtiere entwachsen sind. Insbesondere in den Wintermonaten (äsungsarme Zeit) knabbert das Wild gerne die Knospen der Pflanzen ab. Während der Vegetationsperiode werden auch gerne die Blätter der Pflanzen verzehrt.

Werden die oberen Knospen der Pflanze verbissen, wird ein weiteres Höhenwachstum in der kommenden Vegetationsperiode verhindert. Gebiete mit zu hohem Wildbestand kann man z.B. daran erkennen, dass man sogenannte Bosaibuchen findet. Diese sind Buchen, die z.T älter als 10 Jahr sind, eine Wuchshöhe von unter 50 cm haben und in der Form einem japanischen Bonsai ähneln.

Bei stärkerem Verbiss kann die Pflanze auch so stark geschädigt werden, dass sie abstirbt. Werden nur Seitentriebe geschädigt, so führt dieses meist zu einem Rückgang des Wachstums und zu einer allgemeinen Schwächung der Pflanze, da ihr Blattmasse zur Durchführung der Photosynthese fehlt.

Verbisschäden gehören bis zu einem gewissen Maße zum Ökosystem Wald dazu. Nimmt die Wildpopulation überhand, nehmen auch die Verbisschäden unverhältnismäßig stark zu. Ziel sollte ein Wildbestand sein, der die natürliche Verjüngung der vorkommenden Hauptbaumarten ohne technische Maßnahmen zulässt.

Sollen neue Baumarten in die Bestände eingebracht werden, so sollten diese auch bei angemessenen Wildbeständen zusätzlich geschützt werden, da das Wild dazu neigt, genau die Pflanzen zu verbeissen, die in seinem Revier nur selten vorkommen.

Waldbesitzer sollten sich rechtzeitig mit den zuständigen Jägern in Verbindung setzen und auf eine angemessene Wilddichte oder Bejagungsschwerpunkte drängen. Führt dieses zu keinem befriedigenden Ergebnis, kann der Waldbesitzer durch technische Maßnahmen seine Bäume vor Verbisschäden schützen.

- Der Knotengeflechtzaun ist der Standardschutz gegen Wildverbiss. Er ist sehr haltbar und kann bei sorgfältigem Abbau und, wenn er nicht allzu stark eingewachsen ist, wieder verwendet werden. Nachteil ist, dass er auch wieder abgebaut werden muss. Die Zaunhöhe ist abhängig vom Wildbestand. Tritt nur Rehwild auf, so reicht eine Zaunhöhe von 1,6 m. Bei zusätzlichem Vorkommen von Dam- und/oder Rotwild, sollte der Zaun eine Höhe von 1,8 m haben. In beiden Fällen ist der Zaun unten umzuschlagen, damit sich kein Wild unter dem Zaun hindurchschiebt. Die einzuzäunende Fläche sollte eine gewisse Mindestgröße z.B. von 2.500 m<sup>2</sup> haben, sonst ist Einzelschutz oder der Kauf von größeren Pflanzen möglicherweise die wirtschaftlichere Alternative.



*Zaunbau ist immer noch der Standard beim Verbisschutz (Foto Bölsing).*

- Hordengatter sind aus Holz hergestellte Zaunelemente, die einmal aufgestellt werden und dann im Wald verrotten können. Allerdings ist ihr Anschaffungspreis mit ca. 12 € / lfm fast doppelt so hoch wie der von Drahtzäunen.

Beide Varianten erfordern eine regelmäßige Kontrolle des Zauns und der umzäunten Fläche insbesondere nach Stürmen. Ist Wild in die Fläche eingedrungen, ist es möglichst schnell lebend oder tot zu entfernen. Beschädigte Zäune sind zügig instand zu setzen.

Neben dem flächigen Schutz junger Bäume durch Zäune kann auch ein Einzelschutz sinnvoll sein. Dieser bietet sich bei nur geringer Pflanzenzahl / geringer zu schützender Kulturfläche oder erhöhter Schutzbedürftigkeit seltener Individuen an. Generell sollten Schutzmittel aus Kunststoffen nicht angewendet werden. Diese werden zwar im Lauf der Zeit vom UV-Licht zerstört. Das verbleibende Mikroplastik gelangt aber in den Naturkreislauf, in den es nicht gehört.

- Wuchshüllen sind meist aus Plastik, die zwar im Laufe der Zeit verfallen, aber als Mikroplastik dann den Naturkreislauf vergiften. Ihr Vorteil ist, dass sie einen Treibhauseffekt erzeugen und die Pflanze schnell in die Höhe wächst. Das Wachstum der Seitentriebe wird unterdrückt, was zu Stabilitätsproblemen führen kann. Wuchshüllen schützen auch vor [Fegeschäden](#). (Kosten ca. 3 € / Stk.)
- Drahtgitter sind umweltfreundlicher und bis zu 30 Jahre haltbar. Sie können wiederverwendet werden. Drahtgitter schützen auch vor [Fegeschäden](#). (Kosten ca. 3 € / Stk.)



- Kunststoffkappen schützen nur den Haupttrieb und müssen jedes Jahr erneut aufgesteckt werden. Der umweltbewusste Waldbesitzer sammelt die Plastikkappen nach der Verwendung wieder ein. (Kosten ca. 0,2 bis 0,5 € / Stk.)
- Ungewaschene Schafwolle wird ebenfalls jedes Jahr neu an der Terminalknospe durch Umwickeln befestigt. Sie ist umweltfreundlich und kostengünstig.
- Das Umwickeln der Terminalknospe mit Krepp-Klebeband ist ebenfalls jährlich zu wiederholen, ist umweltfreundlicher als die Verwendung von Plastik und kostengünstig.

## Quellen

[1] Hatesohl, Lennart 2019: Das hilft gegen wilde Leckermäuler, Land & Forst 3/2019, S. 48 f.

From:  
<http://wald-wiki.de/> -

Permanent link:  
[http://wald-wiki.de/klima\\_u\\_fowi/waldschutz/biot\\_schaeden/wirbeltiere/schalenwild/verbiss?rev=1580721266](http://wald-wiki.de/klima_u_fowi/waldschutz/biot_schaeden/wirbeltiere/schalenwild/verbiss?rev=1580721266)

Last update: **2020/10/10 00:14**

