

Insekten

Die Vertreter der artenreichsten Klasse der Gliederfüßer, mit dem Fokus auf die forstlich relevanten dieser Klasse, werden in diesem Bereich beschrieben und deren Auswirkungen und Vermeidungsoptionen dargestellt. Für die Gruppe der [Borkenkäfer an Nadelbäumen](#) liegt eine Broschüre der FNR vor.



Inhalt:

- Zwölfzähliger Föhrenborkenkäfer (*Ips sexdentatus*)
- Ahorn-Rußrindenkrankheit (*Cryptostroma corticale*)
- Asiatischer Laubholzbockkäfer (*Anoplophora glabripenni*)
- Buchdrucker (*Ips typographus*)
- Eichelwickler (*Cydia splendana*)
- Eichenkernkäfer
- Eichenprozessionsspinner (*Thaumetopoea processionea* L.)
- Großer Brauner Rüsselkäfer (*Hyllobius abietes*)
- Großer Frostspanner (*Erannis defoliaria*)
- Große Waldgärtner (*Tomicus piniperda*)
- Grüner Eichenwickler (*Tortrix viridana*)
- Kiefern- oder Forleule (*Panolis flammea*)
- Kiefernbuschhornblattwespe (*Diprion pini*)
- Kiefernprozessionsspinner (*Thaumetopoea pinivora* / *Traumatocampa pinivora*)
- Kiefernspanner (*Bupalus piniarius*)
- Kiefernspinner (*Dendrolimus pini*)
- Kleiner Waldgärtner (*Tomicus minor*)
- Kleiner Frostspanner (*Operophtera brumata* L.)
- Kupferstecher (*Pityogenes chalcographus*)

- [Lärchenborkenkäfer \(*Ips cembrae*\)](#)
 - [Nonne \(*Lymantria monacha* L.\)](#)
 - [Blaue Kiefernprachtkäfer \(*Phaenops cyanea* & *Phaenops formaneki*\)](#)
 - [Rindenbrütende Käfer an Weißtanne \(*Abies alba*\)](#)
 - [Rüsselkäfer \(*Pissodes* spp.\)](#)
 - [Schwammspinner \(*Lymantria dispar*\)](#)
 - [Weißtannenstammlaus](#)
 - [Waldmaikäfer \(*Melolontha hippocastani*\)](#)
-

From:
<https://wald-wiki.de/> -

Permanent link:
https://wald-wiki.de/klima_u_fowi/waldschutz/biot_schaeden/insekten/start?rev=1619433200

Last update: **2021/04/26 12:33**

